


## La Mygale

Fin août après un gros orage ; « Tu viens Emilie, on va chercher des mygales sur le domaine ? »  
- Des quoi (lire coââ !)




- Ben, des mygales maçonnes bien de chez nous. »

Nous voici bientôt arrivés aux abords de talus de terre argileuse, que nos chers chélicérates affectivement pour y établir leur nid profond (15-20 cm), il a plu, l'érosion découvre la partie supérieure du terrier de deux à trois millimètres, laissant l'opercule de sept millimètres de diamètre en relief. Quelques minutes de forage minutieux plus tard, une belle femelle apparaît, crochets déployés face à nous, en position verticale. *Nemesia caementaria* (Latreille) est présente chez nous en Languedoc et Catalogne méditerranéens. Cinq espèces d'araignées mygalomorphes, de la famille des *Ctenizidae* peuvent être découvertes en France.

Celle-ci est de mœurs plutôt nocturnes, la femelle très sédentaire, pouvant vivre plusieurs années, conserve avec elle ses petits longtemps après l'éclosion.

N.B. Némésis, fille de la nuit, déesse grecque de la vengeance et de la justice, réprouvait tout excès. *Caementarius* = maçon.



Taille réelle

La plupart des araignées



Crochets des chélicères perpendiculaires à l'axe du corps

*Nemesia caementaria*



Crochets parallèles à l'axe du corps

C'est ainsi qu'Emilie est devenue, en quelques instants, l'un des meilleurs spécialistes de la découverte de mygales pour tou-te - la - ré-gion !

*Philippe Martin (tiré de la Lettre n° 52 des adhérents des Ecologistes de l'Euzière)*

Voir aussi l'enquête naturaliste (2005-2006) sur le site de l'ONEM <http://mygales.onem-france.org>